

Informations réglementaires

EMULSPHRINE EW++S

Cyperméthrine (CAS 52315-07-8) : 5.99%

Piperonyl Butoxyde (CAS 51-03-6) : 5.64%

D-trans-tétraméthrine (CAS 1166-46-7) : 0.93%

S-Méthoprène (CAS 65733-16-6): 0.1 %

N° BioCID : 78674

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme EUH208 : Contient du 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one peut produire une réaction allergique P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

SOLU'FOGGER Punaises

D-trans-métrine (CAS 1166-46-7) : 0.25%

Perméthrine (CAS 52645-53-1) : 0.5%

Butoxyde de pipéronyle (CAS 51-03-6) : 2.6%

S-Méthoprène (CAS 65733-16-6): 0.1 %

N° BioCID : 81132

EUH208 Contient PERMETHRINE. Peut produire une réaction allergique. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P410 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. P501 Éliminer l'emballage vide auprès d'un récupérateur agréé conformément à la réglementation nationale.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SOLU.FR

TOUTPOURLESNUISIBLES.COM

PENNTYBIO.COM

Traiter juste. protéger mieux

K3D SARL - 04 74 05 25 56

31 allée de la Poste, 42470 Saint Symphorien de Lay

Siret : 499 312 023 | N° agrément : RH02399

info@solu.fr



SOLU'PUNAISES

AEROSOL AUTO VIDANT PUNAISES DE LIT

TRAITEMENT DE VOLUME FOGGER - ONE SHOT

ACTION CHOC INSECTICIDE

Perméthrine, D-Trans-Métrine

AMPLIFICATEUR D'EFFICACITE

Synergiseur Pipéronyle Butoxyde

RÉGULATEUR DE CROISSANCE

RÉMANENCE LONGUE DURÉE

IGR S-Méthoprène



La punaise de lit est connue pour **se nourrir du sang des humains pendant leur sommeil**. Mesurant environ 5 à 7 mm à l'âge adulte, elle se distingue par sa couleur brun rougeâtre et son corps ovale aplati. Ces nuisibles peuvent causer des désagréments significatifs, tels que **des démangeaisons et des troubles du sommeil**.

Les punaises de lit se cachent généralement dans les **matelas, sommiers, cadres de lit, et à proximité de leur source de nourriture**, rendant leur éradication difficile. Elles se propagent facilement d'un endroit à un autre par le biais de **vêtements, bagages, meubles d'occasion**, et peuvent infester tant les habitations privées que les établissements publics. Leur capacité à survivre plusieurs mois sans se nourrir rend la lutte contre ces insectes particulièrement ardue, nécessitant souvent l'intervention de solutions professionnelles comme les traitements insecticides spécifiques.

Formule renforcée = Effet choc

Mode d'action des produits



AEROSOL SOLU'PUNAISES PUNAISES DE LIT EFFET CHOC IMMEDIAT

Permethrine ET D-trans-allethrin (D-trans-méthrine)
En perturbant les canaux sodium des neurones des punaises de lit, la perméthrine provoque leur paralysie suivie de leur mort. Cette action rapide est cruciale pour limiter la propagation des infestations.

Piperonyl Butoxide (PBO)
En bloquant les enzymes responsables de la détoxification des insecticides, le PBO permet à la perméthrine et au D-trans-allethrin d'agir plus efficacement et plus longtemps, garantissant une mortalité accrue des punaises de lit.

S-méthoprène
Notre produit contient une concentration de S-méthoprène environ trois fois plus élevée que celle des formules standards, offrant une protection prolongée contre les infestations.

Quand utiliser l'aérosol fogger SOLU'PUNAISES ?

L'aérosol Fogger SOLU'Punaises 150 ml est destiné à un **traitement d'ambiance ponctuel**, à utiliser **en cas de faible infestation**, afin de provoquer un **effet choc immédiat** sur les punaises de lit présentes et exposées au moment de l'application. Ce type de traitement présente une **rémanence très limitée** : son action est rapide et temporaire, et **n'assure pas une protection durable** après aération de la pièce. Il ne doit donc pas être considéré comme un traitement de fond.

Par ailleurs, **aucun produit insecticide n'agit efficacement sur les œufs** de punaises de lit. Il est donc recommandé de **renouveler le traitement 10 à 14 jours plus tard**, afin d'éliminer les insectes issus des œufs éclos entre-temps, et de compléter l'intervention par un **traitement ciblé des zones de refuge** (plinthes, fissures, structure du lit, coutures).

Enfin, pour éviter toute réinfestation, il est indispensable d'**identifier et de traiter le vecteur d'introduction** de l'infestation : bagages et vêtements après un déplacement, literie ou mobilier d'occasion, cartons stockés, ou environnement voisin infesté.

Sans suppression de cette cause, même un traitement correctement réalisé peut être suivi d'une nouvelle infestation.

En cas de forte infestation, combiner le traitement choc avec fumigène SOLU'Punaises avec un traitement de surface **avec le produit à pulvériser Emulsprhine EW++S**.

Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.



Mode d'emploi

ÉTAPE 1 : La préparation des lieux

- Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60 °C pendant 1 h minimum, puis stocker les dans un endroit non infesté.
- Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées.
- Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation.
- Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux.
- Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.
- Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des punaises.
- En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, goulotte électrique, etc.
- Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont très toxiques pour les organismes aquatiques).
- Sortir tous les animaux domestiques.

ÉTAPE 2 : Le traitement de volume avec les aérosols SOLU'PUNAISES

- Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe dans toutes les pièces infestées. Très facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la pièce.
- À la fin de cette étape, vous devez sortir de votre logement durant 4 heures minimum le temps que le produit sèche.



**Poser l'aérosol
Enclencher**
Appuyer sur la languette et tirer vers vous
Sortir de la pièce

CONSIGNE IMPORTANTE : Lorsque vous appuyez sur la languette, il faut en même temps la tirer vers vous sinon le fumigène ne s'enclenche pas en auto-vidant.

ÉTAPE 5 : Réintégration des lieux et aération

- Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec un masque respiratoire, ouvrir toutes les fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure.

IMPORTANT: Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui auraient pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferait pour une pomme avant de la consommer.

DERNIÈRE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs de punaises n'éclore pas et vous aurez une récurrence lors du retour dans cette pièce.